



ZIMOYEAST 3[®]

integratori speciali | la scelta vincente



Coltura primaria di lieviti a cellule intere essiccate a bassa temperatura derivante dalla fermentazione di ***Kluyveromyces fragilis***, ***Saccharomyces cerevisiae*** e ***Saccharomyces carlsbergiensis***, coltivate su speciali substrati amilacei e zuccherini.

Si usa in tutti gli animali da allevamento ad alta produzione

ZIMOYEAST[®] 3



ZIMOYEAST[®] 3 è un lievito speciale ottenuto da un processo produttivo di fermentazione di **colture primarie** di tre ceppi di lieviti su speciale substrato amilaceo e zuccherino; la massa fermentata viene poi essiccata senza separare la frazione liquida.

Il processo di essiccamento eseguito a **basse temperature** e secondo procedimenti protetti da brevetto, arresta il processo di fermentazione ad un punto prefissato nel quale si mantengono a livelli molto bassi la denaturazione delle **frazioni enzimatiche** e la distruzione delle **vitamine** e di **altri biofattori**.

ZIMOYEAST[®] 3 ha un'azione di tipo "**probiotica**" che è direttamente collegata alla presenza di quote di **enzimi** (attività proteolitica, aminolitica e cellulosa) e di **vitamine naturali del gruppo B** che determinano un'attività modulatrice della microflora ruminale e intestinale.

ZIMOYEAST[®] 3 inoltre, per la presenza di **Kluyveromyces fragilis**, esercita a livello del mangime una importante azione inibente sullo sviluppo delle muffe.

COMPONENTI

Lieviti essiccati da colture di **Kluyveromyces fragilis**, **Saccharomyces cerevisiae** e **Saccharomyces carlsbergiensis**.

ISTRUZIONI PER L'USO

Distribuire, in aggiunta alla razione giornaliera/ mangime completo, g 50-200 per 100 kg, sulla base dei seguenti protocolli d'utilizzo:

- **Bovini adulti:** g 50-200 per q di mangime;
- **Vitelli:** g 100-200 per q di mangime;
- **Pecore/capre:** g 5-10 per capo al giorno;
- **Cavalli:** g 100-200 per q di mangime;
- **Suini adulti e scrofe:** g 50-200 per q di mangime;
- **Suinetti:** g 100-200 per q di mangime;
- **Ovaiole, broilers, tacchini, altri volatili:** g 50-200 per q di mangime;
- **Conigli e animali da pelliccia:** g 50-100 per q di mangime;
- **Pesci:** g 100 per q di mangime.

AVVERTENZA: se ne raccomanda la contemporanea associazione con un epatoprotettore, quale **AMBEREX B FEED** o **EPAMIN PELLET**, sulla base delle indicazioni dei **Tecnici Agrolabo**.

CONFEZIONE: Barattoli da 5 kg, sacchi da 22.65 kg.

ZIMOYEAST[®]: MARCHIO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA DITTA AGROLABO